

浙江中医药大学附属江南医院

杭州市萧山区中医院

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 我 性别: 女 年龄: 50
婚姻状况: 文化程度: 身份证号码:
体检号: 3000527 测试用时: 21:44 报告生成时间: 2024-05-10 11:19:16

测试结果

原始分: 143 用时预警: 正常
标准分: 143 重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	0.0	2.0	5.0	7.0	7.0	22.0	18.0	11.0	35.0	12.0	16.0	16.0	17.0	36.0	7.0	11.0	16.0	16.0	17.0
标准分	37.25	36.61	36.25	38.04	46.94	41.61	43.26	32.48	64.6	48.18	45.85	42.45	45.77	52.31	49.9	34.48	50.85	47.45	46.77

评估结果

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 低分。这种情况多见于所有条目认同为“是”，受试者试图制造一种极端病理的外观。有些则相对有主见或充满自信的正常人，但是他们却不愿意承认该量表提示的哪些轻微的、不受社会赞许的言行或人们共有的“弱点”。

诈病(F): 低分。受试者系统性地回避认同该量表上对大多数（90%以上）正常人来说不能接受的条目，或他们没有受到这些条目的影响；或极力否认患有严重的精神疾病；或是一个十分谦卑、依赖、诚实、单纯和平静的正常人。

防御(K): 低分。（1）表明受试者在涉及心理问题时，承认个人心理资源有限，需进一步调查清楚，受试者是否确实存在他所回答的某些心理问题或精神病理表现；（2）表明受试者特别喜欢倾诉自己的不幸和夸大精神疾病，有的是纯粹的“诈病”者（如司法鉴定中的当事人）。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目，如轻度情绪抑郁，衰弱，但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 正常。表明受试者回答了一些反映其存在症状性抑郁的体验和行为相关的条目。

癔症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 低分。表明受试者往往过分顺从，刻板，墨守成规，传统，缺乏果断兴趣范围狭窄，缺乏创见。对自身感到不满，对他人的反应很敏感，愿意接受他人的意见，但表现无主见，优柔寡断，容易相信他人，往往满足于平庸和单调的生活。男性可能缺乏与异性的兴趣，特别是当该量表分数很低时。

女子气(Mff): 明显升高。精神疾病患者中高分的男性，被认为是被动的，社会敏感，可接近，有广泛的审美观和社会兴趣，并且性格内向，依赖，把自己的男性角色看得不安全，通常倾向于认同女性角色，经常报告有抑郁，焦虑，紧张，罪过感。如男性是同性恋者或有同性恋关注，并且是愿意公开承认这些行为或关注的话，他们将在量表5上得很高的分数。\$0-36

妄想狂(Pa): 正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

精神衰弱(Pt): 正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc): 正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者,在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma): 正常。

社会内向(Si): 正常。表明受试者报告其在社交上外向性和内向性态度和行为处于平衡状态。

指导建议



测评人员: _____

审核医生: _____

日期: 2024-05-10

(本报告结果仅供参考,如需明确自身情况,具体情况请以医生诊断为准。)