

# 浙江中医药大学附属江南医院

## 杭州市萧山区中医院

### 个人信息

姓名: 来醉雄 性别: 男 年龄: 16  
婚姻状况: 文化程度: 从事行业:  
门诊号: 03549051 科室: 心理卫生科 医生: 钱烈

## 症状自评量表(SCL-90)测评报告


### 测试结果

原始分: 207

用时预警: 答题时间过短

标准分: 2

重项预警: 正常



测试结果:	原始分	平均分	参考诊断	均分士标准差
总分	207.0			129.96±38.76
总均分	2.3			1.44±0.43
阴性项目数	19			65.08±18.33
阳性项目数	71			24.92±18.41
阳性项目平均分	2.64			2.60±0.59
躯体化	12.0	2.5	轻	1.37±0.48
强迫状态	10.0	2.8	轻	1.62±0.58
人际关系敏感	9.0	2.0	轻	1.65±0.51
抑郁	13.0	2.69	轻	1.50±0.59
焦虑	10.0	2.1	轻	1.39±0.43
敌对	6.0	1.5	未	1.48±0.56
恐怖	7.0	2.0	轻	1.23±0.41
偏执	6.0	2.17	轻	1.43±0.57
精神病性	10.0	2.0	轻	1.29±0.42



总体评价被试存在较明显心理不适感。

总体评价被试存在较明显心理不适感。

**躯体化：**轻度躯体化症状。反映存在身体不适感，包括心血管、胃肠道、呼吸和其他系统的主诉不适，和头痛、背痛、肌肉酸痛，以及焦虑的其他躯体表现。

**强迫症状：**轻度强迫症状。存在明知没有必要，但又无法摆脱的无意义的思想、冲动和行为。

**人际关系敏感：**轻度人际关系敏感症状。某些个人不自在与自卑感，特别是与其他人相比较时更加突出。在人际交往中感到自卑，心神不安，明显不自在，以及人际交流中的自我意识，消极的期待等。

**抑郁：**轻度抑郁症状。情绪、心境苦闷，可能有生活兴趣减退，动力缺乏，活力丧失等特点。还包括有关死亡的想法和自杀观念。

**焦虑：**轻度躯体化症状。反映存在身体不适感，包括心血管、胃肠道、呼吸和其他系统的主诉不适，和头痛、背痛、肌肉酸痛，以及焦虑的其他躯体表现。

**敌对：**未见明显症状。

**恐怖：**轻度恐怖症状。出门旅行、在空旷的场地、人群中，或公共场所和交通工具上感觉到害怕、不安，也可能表现为社交恐怖。


**偏执：**轻度偏执症状。投射性思维，敌对，猜疑，关系观念，妄想，被动体验和夸大等。

**精神病性：**轻度精神病性症状。各式各样的急性症状和行为，例如行为隐讳，限定不严的精神病性过程指征，也可以反映精神病性行为的继发征兆和分裂性生活方式的指征。

**饮食睡眠：**轻度症状。被试可能存在睡眠和饮食方面的问题。

建议求助于心理咨询，做针对性的心理治疗或在医生的指导下服药。

标准分趋势图



维度标准分趋势图



# 抑郁自评量表(SDS-20)测评报告



## 测试结果

原始分：50

标准分：63

用时预警：答题时间过短

重项预警：正常



中度抑郁症状，请结合临床。

中度抑郁症状，请结合临床。表现为情绪明显低落，缺少愉快体验；对事情兴趣明显下降；自我评价下降，觉得自己不如以前；经常会哭泣或无声流泪；入睡困难，睡眠浅，容易早醒；食欲下降，体重减轻；对性的欲望下降；身体有疲劳感；大脑思考问题反应较慢，对小事情做决定开始犹豫不决。

## 指导建议



长期抑郁状态会对人的心身健康造成影响，甚至引发心身疾病，建议您前往医院精神卫生科或临床心理科或心理咨询中心做进一步的评估确诊，并寻求专业人员的帮助。

常见干预方法：(1)药物治疗；(2)心理治疗；(3)重复经颅磁刺激、直流电刺激、脑电生物反馈等非药物治疗。请您根据医生建议，选择适合自身病情的综合治疗方案，并定期复诊，积极和坚持的治疗态度，将有助于加速疾病的康复。

日常生活建议：

(1)不要给自己确立很难达到的目标，正视自己的病情，不要对事情大包大揽。可以将一件繁杂的工作分成若干小部分，做些力所能及的事，切莫“逞能”，以免完不成工作而心灰意冷。


(2)多参加社会交往或团建活动，寻求友谊和支持。情绪低落是一种很普遍的现象，许多人都会予以理解。努力和朋友保持联系，向信赖的人倾诉内心的烦恼和痛苦。与他人进行愉快的交往更可以使自己获益良多，因为人们会不自觉地在交往中学习如何有效地表达自己的需要和感情，感到更能控制自己的生活，这种感觉可以避免抑郁情绪的产生，也可预防抑郁症的复发。

(3)参加体育锻炼活动。锻炼时人体呼吸发生变化，需要集中注意力躲避障碍物，人体感到疲乏以及肌肉酸痛等，都会使患者转移抑郁思维，提高自信心。

(4)抑郁情绪状态时多参加一些文娱活动。比如郊游、唱歌、跳舞、游泳等，每天坚持半小时左右，持之以恒，可以有效地舒解抑郁情绪。

(5)学会冥想。当我们处于焦虑状态时，可以借助冥想音乐引导自己进行轻松美好的想象状态，便能化解焦虑与不安。闭上眼睛，在脑海中构想此时自己身处优美恬静的环境，在大海岸边，波涛阵阵，鱼儿不断跃出水面，海鸥在天空飞翔，您光着脚丫，走在凉丝丝的海滩上，海风轻轻地拂着您的面颊……暂时忘记一切的您，仿佛融入其中、身临其境，很是惬意。

标准分趋势图



维度标准分趋势图



# 焦虑自评量表(SAS-20)测评报告



## 测试结果

原始分：36

标准分：45

用时预警：答题时间过短

重项预警：正常





## 诊断说明



未见明显焦虑症状。

未见明显焦虑症状。

## 指导建议




您目前未见明显焦虑症状，状态良好，请继续保持目前的生活方式，保持乐观积极的心态。


## 历史趋势



### 标准分趋势图



### 维度标准分趋势图



## 最高分项



测评人员： \_\_\_\_\_

审核医生： \_\_\_\_\_

日期： 2024-05-26 \_\_\_\_\_

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)